

IbuMejoral®

Ibuprofeno 400

LEA CON CUIDADO ESTA INFORMACIÓN ANTES DE TOMAR EL MEDICAMENTO

¿QUÉ CONTIENE IbuMejoral®VL? Principio Activo: Ibuprofeno 400 mg Fórmula: Ibuprofeno (como ibuprofeno DC 90) 400,000 mg, talco 5,000 mg, croscarmelosa sódica 5,000 mg, celulosa microcristalina 120,000 mg, lay AQ P35004ME 16,867 mg, azul indigotina laca aluminica 0,132 mg.

ACCIONES: Analgésico (calma el dolor) - Antifebril (baja la fiebre) - Antiinflamatorio (reduce la inflamación).

¿PARA QUÉ SE USA ESTE MEDICAMENTO? Este medicamento está indicado para el alivio sintomático de dolores (de espalda, de cabeza, musculares, de dientes, menstruales) dolores asociados a estados gripales y para bajar la fiebre y la inflamación.

¿CÓMO SE USA ESTE MEDICAMENTO? Vía de administración oral. Adultos y mayores de 15 años: 1 cápsula blanda cada 8 horas. Mientras los síntomas persistan, el intervalo mínimo entre dosis puede ser de 6 horas, sin exceder la dosis máxima de 3 cápsulas blandas de 400 mg (1.200 mg / día). Tomar preferentemente después de las comidas. No tomar por más de 5 días para el dolor ó 3 para la fiebre. Si los síntomas persisten o empeoran por más de 48 / 72 horas consulte a su médico.

¿QUÉ PERSONAS NO PUEDEN RECIBIR ESTE MEDICAMENTO? No use este medicamento si: Es alérgico al ibuprofeno, aspirina, a otros antiinflamatorios similares o a otros ingredientes del producto. Tiene o ha tenido úlcera en el estómago. Está tomando otros productos conteniendo ibuprofeno u otros antiinflamatorios. Padece de enfermedad del hígado o riñones. Niños menores de 15 años.

¿QUÉ CUIDADOS DEBO TENER ANTES DE TOMAR ESTE MEDICAMENTO? Tenga especial precaución y consulte con su médico antes de tomar este medicamento si: Es mayor de 65 años. Tiene asma o alergia. Tiene presión arterial alta. Tiene problemas circulatorios. Tiene problemas de estómago (ardor estomacal, acidez). Si usted consume tres (3) ó más vasos diarios de bebida alcohólica. Si usted recibe algún otro medicamento, está embarazada o dando el pecho a su bebé consulte a su médico antes de tomar este medicamento

¿QUÉ CUIDADOS TENER MIENTRAS TOMA ESTE MEDICAMENTO? Suspenda su uso y consulte a su médico inmediatamente si experimenta: Alergias como erupción en la piel y picazón, que puede acompañarse de dificultad para respirar, hinchazón de labios, lengua, garganta o cara. Empeoramiento de su asma. Náuseas, acidez, dolor estomacal, síntomas en el tránsito intestinal.

¿QUÉ DEBO HACER ANTE UNA SOBREDOSIS, O SI TOMÓ MÁS CANTIDAD DE LA NECESARIA? Llame a un centro de Intoxicaciones, o vaya al lugar más cercano de asistencia médica. Hospital de Pediatría Ricardo Gutiérrez: (011) 4962-6666 / 2247 Hospital Dr. Alejandro Posadas: (011) 4654-6648 / 4658-7777 Centro de Asistencia Toxicológica La Plata: (0221) 451-5555

FORMA DE CONSERVACIÓN: Almacenar por debajo de 30 °C. Proteger de la luz excesiva y de la humedad.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. ANTE CUALQUIER DUDA CONSULTE CON SU MÉDICO Y/O FARMACÉUTICO ¿TIENE UD. ALGUNA PREGUNTA? En caso de ser necesario, comuníquese con Elisium S.A. (011) 4633-5790 / ANMAT Responde: 0800-333-1234 Elaborado en: Estrada dos Estudantes 349 Ciudad de Cotia, Brasil. Acondicionamiento primario y secundario en: Santa Rosa 3676 Victoria, Provincia de Buenos Aires, Argentina. Director Técnico: Pablo Minkowicz — Farmacéutico. Elisium S.A., Bacacay 1739, CABA. Especialidad medicinal autorizada por el Ministerio de Salud Certificado N°: 56.669. Fecha de la última revisión: octubre de 2013.

www.ibumejoral.com.ar